








Numero di coppie stimate per 40 ha									
Vegetali dominanti	Erba da pascolo		Erbe e cespugli			Foresta di pini			Climax a quercia e <i>Carya</i>
	1-2	2-3	15	20	25	35	60	100	
Età in anni dell'arca studiata									
Specie di Uccello									
<i>Ammodramus savannarum</i>	10	30	25						
<i>Sturnella magna</i>	5	10	15	2					
<i>Spizella pusilla</i>			35	48	25	8	3		
<i>Geothlypis trichas</i>			15	18					
<i>Icteria virens</i>			5	16					
<i>Richmondia cardinalis</i>			5	4	9	10	14	20	23
<i>Pipilo erythrophthalmus</i>			5	8	13	10	15	15	
<i>Aimophila aestivalis</i>				8	6	4			
<i>Dendroica discolor</i>				6	6				
<i>Vireo griseus</i>				8		4	5		
<i>Dendroica pinus</i>					16	34	43	55	
<i>Piranga rubra</i>					6	13	13	15	10
<i>Tyrtochlorus ludovicianus</i>						4	5	20	10
<i>Parus carolinensis</i>						2	5	5	5
<i>Polioptila caerulea</i>						2	13	13	13
<i>Sitta pusilla</i>							2	5	
<i>Contopus virens</i>						10	1		3
Trochilidae							9	10	10
<i>Parus bicolor</i>							6	10	15
<i>Vireo flavifrons</i>							3	5	7
<i>Wilsonia citrina</i>							3	30	11
<i>Vireo olivaceus</i>							3	10	43
<i>Dendrocopos villosus</i>							1	3	5
<i>Dendrocopos pubescens</i>							1	2	5
<i>Myiarchus crinitus</i>							1	10	6
<i>Hylocichla ustulata</i>							1	5	23
<i>Coccyzus americanus</i>								1	9
<i>Mniotilta varia</i>									8
<i>Oporornis formosus</i>									5
<i>Empidonax virens</i>									5
Totale, incluse le specie più rare non elencate sopra	15	40	110	136	87	93	158	239	228




Scuola di Uppsala







Primary Succession (no life already existed here)



Successione secondaria

